

RAPIMASTER **FICHA TÉCNICA**

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL	: RAPIDMAX 500
NOMBRE COMÚN	: Enraizador
CLASE DE USO	: Fertilizante foliar
TIPO DE FORMULACIÓN	: Líquido soluble
FABRICANTE FORMULADOR	: ITAGRO S.A.
DISTRIBUIDOR	: Industria Tecnológica Agrícola del Perú SA.
PROCEDENCIA	: Perú

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno total	: 5.0%
Fósforo (P ₂ O ₅)	: 35.0%
Azufre (S)	: 0.4%
Magnesio (Mg)	: 0.4%
Zinc (Zn)	: 0.5%
Materia Húmica	: 5.0%
Biohormonas	: 600 ppm

PROPIEDADES FÍSICAS

ESTADO FÍSICO	: Líquido
OLOR	: Tenue Aromático
SOLUBILIDAD	: 100% Soluble En Agua
ESTABILIDAD	: Estable bajo condiciones normales de temperatura y luminosidad.
PERSISTENCIA DE ESPUMA	: No forma espuma
CORROSIVIDAD	: No Corrosivo.
INFLAMABILIDAD	: No Inflamable
EXPLOSIVIDAD	: No Explosivo

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN

RAPIDMAX 500 es un nutriente foliar líquido, orientado a estimular el enraizamiento y el engrosamiento de tallos en la producción de plántulas, trasplantes, estacas y árboles frutales.

El balance equilibrado de sus componentes permite la interacción entre el complejo o sistema hormonal y la asimilación de nutrientes lográndose un desarrollo radicular notable y un crecimiento rápido y vigoroso de plántulas garantizado por el contenido generoso de P y K.

Los cultivos tratados, tienen la opción de aprovechar mejor los recursos del suelo en lo que se refiere a los recursos hídricos y nutrientes por su gran desarrollo radicular que le confiere mayor capacidad de absorción.

DOSIFICACIONES Y MOMENTO DE APLICACIÓN

DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
0.5 - 1.5 Por 100m ²	Producción de plántulas en invernaderos o almácigos: Aplicar con el agua de riego semanalmente desde la primera semana del desarrollo de las plántulas.
0.5 - 2.0 Por 100L	Trasplante al campo definitivo: 50 a 100ml / planta; repetir cada 15 días, mínimo 3 veces más
4-6 L / Ha	Fertirrigación: Aplicar a través del sistema, desde la primera semana del trasplante; repetir cada 15 días tres veces más como mínimo.
5-6 L/100 L agua	Frutales establecidos: 1 L de solución / m de altura de los árboles; dirigido a la base (En drench); hacer coincidir con el riego.
3-4 L/ha	Aplicación foliar: Dosificar al 1% iniciando las aplicaciones desde la primera semana del trasplante, emergencia o brote de yemas; repetir semanalmente mínimo cuatro veces más.

OBS. Indicado para todo tipo de cultivos

- Puede ser utilizado en cualquier cultivo, viveros, almácigos y/o invernaderos.
- Se puede aplicar dirigido al suelo; a pie de planta; o foliarmente
- Se puede aplicar por sistemas de fertirrigación
- Se puede mezclar con cualquier pesticida a excepción de los que tienen reacción alcalina.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES DE USO:

RAPIDMAX 500 - Es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y sustancias afines, de uso frecuente, No es compatible con productos que tengan en su formulación CALCIO.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y/o aplicación.
Conservar en lugar seguro seco, fresco y bien ventilado, manteniendo el envase cerrado y etiquetado. No transportar ni almacenar con alimentos. Al contacto con los ojos lavar con agua no menos de 15 minutos, al contacto con la piel utilizar agua y jabón.

Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.
Departamento Técnico